

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -8-4-68 771202

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

5, Place Paul Jamot - 51-REIMS - Tél. 47.22.87

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

BULLETIN N° 91 d'AVRIL 1968

1e 2 AVRIL 1968

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS

Tavelure du pommier -

Les variétés ayant atteint le stade C3 dans la Marne et l'Aube, et qui n'ont pas été encore protégées, doivent recevoir un traitement avant les prochaines pluies car les projections d'ascospores sont possibles dès maintenant.

Dans les Ardennes, ce traitement se justifiera lorsque les variétés seront aux stade précité.

Tavelure du poirier -

Des contaminations sont maintenant possibles, soit par les pustules chancreuses de tavelure, soit par ascospores, aussi les variétés qui n'auraient pas été traitées après notre dernier avis doivent être impérativement protégées avant les prochaines pluies.

INFORMATIONS

Puceron vert du pommier -

Les premières éclosions ont été observées pendant les dernières 48 heures, mais il faudra encore quelques jours pour qu'elles soient totales. Dans les zones particulièrement chaudes, une intervention est possible dès réception de l'avis, mais elle peut être retardée jusqu'à notre prochain avis en particulier dans les Ardennes. Présentement, seuls les insecticides de contact sont recommandés.

Oïdium du pommier -

Le réchauffement de ces derniers jours a été favorable à la maladie. Dans les vergers où celle-ci sévit particulièrement, plusieurs traitements préfloraux sont recommandés pour la protection des rosettes foliaires. Rappelons :

- que les pulvérisations contre l'oïdium doivent être appliquées très soigneusement ;
- que les soufres ont également une action antitavelure

71.237

L'addition d'un mouillant dans les bouillies antioïdium est actuellement recommandée ; cependant l'emploi de mouillants pour les traitements postfloraux contre l'oïdium ou contre les tavelures appelle des réserves. Se référer à cet égard aux recommandations des firmes commerciales concernant leurs spécialités.

Teigne du cerisier -

Les premières pénétrations des chenilles dans les boutons ont été observées. L'emploi d'un oléoparathion peut encore protéger une partie des bouquets floraux; si une intervention est envisagée, la faire dès réception de l'avis.

GRANDE CULTURE

INFORMATION

Meligèthes du colza

Les températures anormalement élevées pour la saison dont nous bénéficions depuis quelques jours ont provoqué la sortie des méligèthes et leur arrivée sur les colzas.

Les boutons sont encore très petits et la floraison éloignée. Il est donc nécessaire de surveiller attentivement les cultures afin d'éviter des dégâts **sérieux**.

Il y a lieu d'intervenir avant qu'un préjudice sensible soit occasionné aux cultures (tolérance : 10 % de boutons attaqués). Un traitement **trop** précoce rend souvent nécessaire une ou plusieurs interventions ultérieures par suite du réenvahissement des cultures par les insectes et aussi en raison de la faible rémanence des produits sur des plantes en pleine croissance.

Dans les grandes parcelles, les pullulations de méligèthes peuvent n'intéresser que les bordures des pièces, bien que les températures élevées aient favorisé la dispersion des insectes. Eventuellement, n'intervenir que sur une bande de 25 à 30 m. de largeur sur le pourtour des champs.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles.

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytop sanitaire "CHAMPAGNE"